

# EQUITRIG®

L'integratore alimentare  
PER IL RIEQUILIBRIO DI  
COLESTEROLO E TRIGLICERIDI

E' un integratore alimentare contenente ingredienti naturali che aiutano a riequilibrare i livelli di colesterolo e trigliceridi plasmatici.

## I PRINCIPALI COMPONENTI SONO:

**Riso rosso fermentato**, titolato in Monacolina K, contribuisce al mantenimento dei livelli normali di colesterolo e trigliceridi nel sangue.

**Cassia nomame** contribuisce all'equilibrio del peso corporeo ed al metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo.

**Policosanoli** sono costituiti da alcoli grassi il cui componente più significativo è l'octacosanolo, utili nel ridurre i livelli di colesterolo.

**Niacina (vitamina B3)** favorisce il normale metabolismo energetico contribuendo alla diminuzione del rischio cardiovascolare.

**Acido Folico (vitamina B9)** interviene nel processo di divisione delle cellule e contribuisce al normale metabolismo dell'omocisteina.

## INDICAZIONI:

L'assunzione quotidiana di **Equitrig** favorisce i benefici del corretto regime alimentare e ritarda il ricorso a terapie farmacologiche in pazienti con dislipidemia lieve - moderata e basso rischio cardiovascolare.

# EQUITRIG®

L'integratore alimentare  
PER IL RIEQUILIBRIO DI  
COLESTEROLO E TRIGLICERIDI

Riassunto  
caratteristiche  
tecniche

## SOSTANZE CARATTERIZZANTI

Sostanze caratterizzanti	Per dose giornaliera (una compressa da 800mg)	% RDA
Riso rosso fermentato Monakolina K	334 mg 10 mg	
Cassia Nomame in catechine	200 mg 16 mg	
Niacina (Vitamina PP o B3)	24 mg	150 %
Policosanoli in Ocatacosanolo	10 mg 0,5 mg	
Acido folico (Vitamina b9)	200 mcg	100 %

## Modalità d'uso

1 compressa al giorno per un periodo di almeno 8 settimane, che può essere prolungato dal Medico curante.

Confezione da 30 compresse divisibili

Costo per il paziente € 0,60 al giorno

## SENZA ALLERGENI

### Avvertenze

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata.

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.

Non assumere in caso di ipersensibilità o di allergie verso 1 o più componenti.

Non assumere in caso di terapia con ipolipemizzanti.

Da non usare in gravidanza o durante l'allattamento.

